

**URO-2 MASSE RÉNALE SOLIDE/KYSTE COMPLEXE
(URGENT/SEMI-URGENT)
(ordonnance collective)**

Exclusion

Kyste simple, insuffisance rénale aiguë
Hématurie macroscopique avec critère d'exclusion (Cf. URO-01)

Infirmière

- Évaluation spécifique
- Coordination d'examens
- Suivi clinique de l'utilisateur lors de l'investigation

Spécialiste

- Consultation en urologie
- Investigation spécifique selon l'évaluation
- Décision

Médecin référent

- Retour de l'information par :
 - Lettre dictée du spécialiste
 - Résumé d'investigation de l'infirmière

**Kyste complexe
Bosniak 2/4, 3/4, ou 4/4**

Laboratoires

Créatinine et DFGe

Imagerie médicale

TACO rénale 4 phases

Consultation en urologie

Vérifier :

Débit filtration glomérulaire estimé (DFGe)
Réaction à l'iode

Masse rénale solide

Laboratoires

FSC, Électrolytes, Phosphatase alcaline, Urée, créatinine, Calcémie, Clairance de la créatinine, Débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe)

Imagerie médicale

TACO rénale 4 phases
TACO Thoracique

Scintigraphie osseuse
(avant la consultation en urologie)

Consultation en urologie

Si DFGe < 60 ml / min : Discussion avec l'urologue

Réaction à l'iode

Mineure : rougeur au visage, chaleur, nausées, démangeaison, toux, urticaire, œdème localisé

Sévère : difficulté respiratoire ou à avaler, œdème généralisé

- TACO avec préparation si réaction mineure
- Discussion avec l'urologue si réaction sévère

