


Faits saillants

RAPPORT D'ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS D'INFIRMIÈRES ET DE GESTIONNAIRES ŒUVRANT EN PREMIÈRE LIGNE

THÈME : Pratiques cliniques
préventives aux ITSS

Octobre 2012



Auteure et collaborateurs

AUTEURE

Marie-Claude Drouin, Institut national de santé publique du Québec

COORDINATION

Nicole Marois, Institut national de santé publique du Québec

COLLABORATEURS

Claude Laberge, ministère de la Santé et des Services sociaux

Catherine Risi, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

Stéphane Roy, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

Kim Payette-Chapleau, Institut national de santé publique du Québec

MISE EN PAGE

Adeline Briand, Institut national de santé publique du Québec

Remerciements à Louise De la Boissière et France Janelle, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, pour la validation de cette présentation

Contexte de la démarche

2 formations :

- Plus de 1 500 infirmières ont bénéficié du programme national de formation *Intervention de dépistage des ITSS : la contribution de l'infirmière*
- Près de 1 000 infirmières ont participé à la formation *Intervention préventive auprès des personnes atteintes d'une ITS et auprès de leurs partenaires (IPPAP)*

Objectif de la démarche

Dans un contexte de renouvellement et de mise à jour des programmes de formation :

- Mener une enquête sur les pratiques cliniques préventives relatives aux ITSS (PCP-ITSS) effectuées par les participantes aux Programmes nationaux de formation.
- Enquête réalisée en mai – juin 2011

Objectifs de l'enquête

Auprès des gestionnaires :

- Décrire l'implantation des services de dépistage des ITSS
- Évaluer les besoins de formation des infirmières de leurs services

Auprès des infirmières :

Évaluer :

- Les PCP-ITSS effectuées, incluant le dépistage et l'IPPAP;
- Leurs habiletés dans ces PCP;
- Les conditions dans lesquelles elles les effectuent;
- Leurs besoins de formation.

Partie 1

Les questionnaires




Enquête auprès des gestionnaires

Méthode

- Les coordonnateurs en MI et/ou les chargés de dossier ITSS ont envoyé le questionnaire aux gestionnaires de leur réseau.
- Les questions portaient sur l'implantation d'un service de dépistage des ITSS par l'infirmière.
- 92 gestionnaires ont complété le questionnaire.

Enquête auprès des gestionnaires



Encadrement par la formation

À propos des infirmières travaillant dans leurs services :

- 90,2 % des gestionnaires ont indiqué qu'elles ont suivi une **formation théorique**;
- 62,0 % des gestionnaires ont indiqué qu'elles ont eu accès à une **formation pratique** (ex : examen gynécologique, prélèvements pour le dépistage des ITSS, dépistage du cancer du col de l'utérus).

L'implantation d'un service de dépistage

Mesures mises en place dans le cadre de l'implantation d'un service de dépistage des ITSS :

	n	%
Transmission au laboratoire d'analyse de biologie médicale du numéro de pratique et du nom des infirmières concernées	68	73,9
Corridor de services avec des médecins	69	75,0
Formulaire de collecte de données pour le dépistage des ITSS	62	67,4
Offre d'activités de soutien en matière d'ITSS, par exemple communautés ou réseaux de pratique, discussion de cas, supervision clinique, etc.	45	48,9
Ordonnance collective pour le traitement des ITSS asymptomatiques	35	38,0
Ordonnance collective pour effectuer des tests chez les personnes symptomatiques	12	13,0

Les enjeux d'implantation

Facteurs facilitants du travail de l'infirmière (n=74)

- Collaboration avec les médecins (n=26)
- Présence d'ordonnance collective (n=7)
- Soutien de la santé publique (n=6)
- Offre de formation (n=5)
- Stabilité des effectifs (n=4)

Obstacles et difficultés de l'implantation (n=53)

- Organisation de services (n=44)
- Recrutement d'un milieu clinique pour la formation pratique des infirmières (n=23)

Soutien dans l'offre de formation

76,9% des gestionnaires souhaitent que l'INSPQ offre aux régions **un programme de formation pratique** visant à soutenir le processus d'habilitation des infirmières aux activités de dépistage des ITSS.

Partie 2

Les infirmières




Enquête auprès des infirmières

Méthode

- L'INSPQ a envoyé les questionnaires aux infirmières ayant déjà suivi l'un ou l'autre des deux programmes de formation concernés.
- 237 infirmières ont complété le questionnaire (taux de réponse de 52,5%).
- Les questions portaient sur :
 1. Leur accès aux formations sur le dépistage des ITSS,
 2. Leur habilité auto-perçue à effectuer du dépistage des ITSS,
 3. Leurs conditions de travail.

Enquête auprès des infirmières



Participation à des formations

Formation	n	%
<i>Intervention de dépistage des ITSS</i>	226	98,3
IPPAP	157	73,4
Acquisition d'habiletés techniques	78	33,3

Près de 46 % des infirmières ont indiqué avoir parfois ou souvent accès à des activités de soutien à la pratique.

Dépistage des ITSS par l'infirmière

- Les trois quart des répondantes (n=178) font du dépistage de l'une ou l'autre des ITSS à leur nom ou à celui du médecin.
 - 70,2 % d'entre elles font du dépistage d'au moins une ITSS à leur nom.

ITSS	À mon nom		Au nom du médecin		Aucun test	
	n	%	n	%	n	%
Chlamydia (n = 233)	123	52,8	47	20,2	63	27,0
Gonorrhée (n = 231)	117	50,6	46	19,9	68	29,5
Syphilis (n = 232)	107	46,1	45	19,4	80	34,5
VHB (n = 228)	104	45,6	45	19,7	79	34,6
VHC (n = 231)	103	44,6	44	19,0	84	36,4
VIH (n = 231)	107	46,3	45	19,5	79	34,2

Savoir-faire des infirmières

Estimez-vous avoir les habiletés requises pour aborder les sujets suivants lorsque vous réalisez une intervention en lien avec le dépistage des ITSS ?

Activités préventives en lien avec les ITSS	Habilités insuffisantes		Habilités suffisantes	
	n	%	n	%
Vaccination contre les hépatites A et B (n = 235)	19	8,1	216	91,9
Comportements sécuritaires (n = 234)	4	1,7	230	98,3
Mode de transmission des ITSS (n = 234)	8	3,4	226	96,6
Facteurs de risque des ITSS (n = 234)	8	3,4	226	96,6
Indications de dépistage des ITSS (n = 234)	13	5,6	221	94,4
Signes et symptômes des ITSS (n = 235)	9	3,8	226	96,2
Période fenêtre des différentes ITSS (n = 235)	42	18,0	192	82,0
Tests de dépistage appropriés pour l'infection suspectée (n = 234)	37	15,8	197	84,2
Stratégies de changement de comportements (n = 234)	55	23,5	179	76,5

Enjeux préoccupants

Autour de 50 % des répondantes qui font du dépistage estiment avoir des habiletés insuffisantes pour effectuer des prélèvements au col de l'utérus (pap test), à l'urètre et à l'anus.

Types de prélèvement	Dépistage	Habiletés insuffisantes ou très insuffisantes		Habiletés suffisantes ou très suffisantes	
	n	n	%	n	%
Sérologie (ponction veineuse) (n = 223)	Oui (175)	8	4,6	167	95,4
	Non (48)	12	25,0	36	75,0
Endocol : prélèvement pour la gonorrhée et la chlamydia (n = 225)	Oui (176)	81	46,0	95	54,0
	Non (49)	43	87,8	6	12,2
Endocol (Pap test) si ordonnance collective en vigueur dans le milieu (n = 217)	Oui (168)	96	57,1	72	42,9
	Non (49)	44	89,8	5	10,2
Urètre (n = 220)	Oui (171)	96	56,1	75	43,9
	Non (49)	41	83,7	8	16,3
Anus (n = 219)	Oui (170)	88	51,8	82	48,2
	Non (49)	41	83,7	8	16,3
Pharynx (n = 221)	Oui (173)	56	32,4	117	67,6
	Non (48)	32	66,7	16	33,3

Conditions de travail

Les infirmières qui font du dépistage à leur nom ou au nom du médecin (n=178), comparées à celle qui ne font pas de dépistage, sont significativement plus nombreuses à affirmer avoir accès à :

- une règle de soin;
- un bureau fonctionnel;
- du matériel nécessaire pour les prélèvements;
- des services de transport des prélèvements selon les normes;
- des dépliants d'informations sur les ITSS;
- un formulaire de collecte de données pour le dépistage des ITSS;
- une ordonnance collective pour le traitement des ITSS asymptomatiques.

**Des conditions essentielles
à l'implantation du
dépistage par l'infirmière**

Conditions de travail

- 86,7 % des répondantes qui ont indiqué faire le dépistage d'au moins une ITSS à leur nom (n = 106/123) ont indiqué que leur **nom et leur numéro de pratique ont été transmis à un laboratoire médical**, 5,7 % des répondantes (n = 7) ont indiqué que la démarche était en cours.
- La majorité des infirmières qui font du dépistage à leur nom ou à celui du médecin ont indiqué avoir **un corridor de service** établi avec un professionnel de la santé

L'implantation d'un service de dépistage par l'infirmière

Facteurs facilitants

- Organisation des services (n=37)
- Accessibilité à diverses ressources (n=35)
- Formation et acquisition de connaissances et d'habiletés techniques (n=25)
- Collaboration et partenariat (n=21)
- Présence d'une ordonnance collective (n=20)

Obstacles

- Manque de ressources ou ressources inadéquates (n=18)
- Difficulté d'établir des liens fonctionnels de collaboration et de partenariat (n=18)

Perceptions quant au dépistage des ITSS

	Gestionnaires		Infirmières	
	n	%	n	%
Le dépistage des ITSS est un service qui doit être prioritaire.	86	93,5	229	97,8
Le rôle de l'infirmière en matière de dépistage des ITSS est important.	81	95,5	230	98,2
Le rôle du médecin en matière de dépistage des ITSS est important.	83	90,2	223	94,2

www.inspq.qc.ca

Conclusion

Conclusion

Gestionnaires

Les résultats de l'enquête montrent que les gestionnaires jouent un rôle important dans l'implantation du dépistage des ITSS par l'infirmière.

Les gestionnaires doivent être informés sur leur rôle dans la prévention des ITSS et des outils devraient être mis à leur disposition. Une réflexion est à faire quant au soutien qui pourrait leur être apporté.

Considérant ce rôle, des liens sont à créer, ou à consolider, entre la santé publique et les gestionnaires de services de santé.

Conclusion (suite)

Infirmières

Il apparaît nécessaire de mieux outiller les infirmières quant à :

- Leurs habiletés en matière de prélèvements;
- Leurs connaissances sur les périodes fenêtres des différentes ITSS;
- Les tests appropriés;
- Les stratégies de changement de comportement.

Une volonté commune

Globalement, les résultats de l'enquête appuient le **développement d'un ensemble de mesures supportant une offre de formation** incluant des activités de formation continue et de formation pratique dans le respect des rôles et responsabilités des instances locales, régionales et nationales.